



VARİS ÇORAPLARI
COPMRESSION STOCKINGS



DBA-4930

CCL1 DİZALTI BURNU AÇIK VARİS ÇORABI 18-21 mmHg

Cerrahi müdahale sonrası yatan hastalarda, yatağa bağımlı hastalarda pıhtı oluşumunu engellemek için kullanılması tavsiye edilir.

CCL1 KNEE OPEN NOSE STOCKINGS 18-21 mmHg

It is recommended to be used in hospitalized patients after surgical intervention and in bedridden patients to prevent clot formation.

DBA-4930	DBA-4931	DBA-4932	DBA-4933	DBA-4934	DBA-4935	DBA-4936
XS	S	M	L	XL	XXL	3XL
1	2	3	4	5	6	7



DBA-4990

CCL2 DİZALTI BURNU AÇIK VARİS ÇORABI 23-32 mmHg

Cerrahi müdahale sonrası yatan hastalarda, yatağa bağımlı hastalarda pıhtı oluşumunu engellemek için kullanılması tavsiye edilir.

CCL2 KNEE OPEN TOE STOCKINGS 23-32 mmHg

It is recommended to be used in hospitalized patients after surgical intervention and in bedridden patients to prevent clot formation.

DBA-4990	DBA-4991	DBA-4992	DBA-4993	DBA-4994	DBA-4995	DBA-4996
XS	S	M	L	XL	XXL	3XL
1	2	3	4	5	6	7



DBA-5050

CCL3 DİZALTI BURNU AÇIK VARİS ÇORABI 34-46 mmHg

Cerrahi müdahale sonrası yatan hastalarda, yatağa bağımlı hastalarda pıhtı oluşumunu engellemek için kullanılması tavsiye edilir.

CCL3 KNEE OPEN NOSE STOCKINGS 34-46 mmHg

It is recommended to be used in hospitalized patients after surgical intervention and in bedridden patients to prevent clot formation.

DBA-5050	DBA-5051	DBA-5052	DBA-5053	DBA-5054	DBA-5055	DBA-5056
XS	S	M	L	XL	XXL	3XL
1	2	3	4	5	6	7



DBA-4950

CCL1 DİZÜSTÜ SİLİKONLU BURNU AÇIK VARİS ÇOR. 18-21 mmHg

Cerrahi müdahale sonrası yatan hastalarda, yatağa bağımlı hastalarda pıhtı oluşumunu engellemek için kullanılması tavsiye edilir.

CCL1 LAPTOP SILICONE OPEN TOE STOCKINGS 18-21 mmHg

It is recommended to be used in hospitalized patients after surgical intervention and in bedridden patients to prevent clot formation.

DBA-4950	DBA-4951	DBA-4952	DBA-4953	DBA-4954	DBA-4955	DBA-4956
XS	S	M	L	XL	XXL	3XL
1	2	3	4	5	6	7



DBA-5010

CCL2 DİZÜSTÜ SİLİKONLU BURNU AÇIK VARİS ÇOR. 23-32 mmHg

Cerrahi müdahale sonrası yatan hastalarda, yatağa bağımlı hastalarda pıhtı oluşumunu engellemek için kullanılması tavsiye edilir.

CCL2 LAPTOP SILICONE OPEN TOE COMPRESSION STOCKINGS

It is recommended to be used in hospitalized patients after surgical intervention and in bedridden patients to prevent clot formation.

DBA-5010	DBA-5011	DBA-5012	DBA-5013	DBA-5014	DBA-5015	DBA-5016
XS	S	M	L	XL	XXL	3XL
1	2	3	4	5	6	7



DBA-5070

CCL3 DİZÜSTÜ SİLİKONLU BURNU AÇIK VARİS ÇORABI 34-46 mmHg

Cerrahi müdahale sonrası yatan hastalarda, yatağa bağımlı hastalarda pıhtı oluşumunu engellemek için kullanılması tavsiye edilir.

CCL3 LAPTOP SILICONE OPEN TOE STOCKINGS 34-46 mmHg

It is recommended to be used in hospitalized patients after surgical intervention and in bedridden patients to prevent clot formation.

DBA-5070	DBA-5071	DBA-5072	DBA-5073	DBA-5074	DBA-5075	DBA-5076
XS	S	M	L	XL	XXL	3XL
1	2	3	4	5	6	7



DBA-4960

CCL1 KÜLOTLU BURNU KAPALI VARİS ÇORABI 18-21 mmHg

Cerrahi müdahale sonrası yatan hastalarda, yatağa bağımlı hastalarda pıhtı oluşumunu engellemek için kullanılması tavsiye edilir.

CCL1 CLOSED TOE WITH PANTS 18-21 mmHg

It is recommended to be used in hospitalized patients after surgical intervention and in bedridden patients to prevent clot formation.

DBA-4960	DBA-4961	DBA-4962	DBA-4963	DBA-4964	DBA-4965	DBA-4966
XS	S	M	L	XL	XXL	3XL
1	2	3	4	5	6	7



DBA-5020

CCL2 KÜLOTLU BURNU KAPALI VARİS ÇORABI 23-32 mmHg

Cerrahi müdahale sonrası yatan hastalarda, yatağa bağımlı hastalarda pıhtı oluşumunu engellemek için kullanılması tavsiye edilir.

CCL2 CLOSED TOE WITH PANTS 23-32 mmHg

It is recommended to be used in hospitalized patients after surgical intervention and in bedridden patients to prevent clot formation.

DBA-5020	DBA-5021	DBA-5022	DBA-5023	DBA-5024	DBA-5025	DBA-5026
XS	S	M	L	XL	XXL	3XL
1	2	3	4	5	6	7



DBA-5080

CCL3 KÜLOTLU BURNU KAPALI VARİS ÇORABI 34-46 mmHg

Cerrahi müdahale sonrası yatan hastalarda, yatağa bağımlı hastalarda pıhtı oluşumunu engellemek için kullanılması tavsiye edilir.

CCL3 CLOSED TOE WITH PANTS 34-46 mmHg

It is recommended to be used in hospitalized patients after surgical intervention and in bedridden patients to prevent clot formation.

DBA-5080	DBA-5081	DBA-5082	DBA-5083	DBA-5084	DBA-5085	DBA-5086
XS	S	M	L	XL	XXL	3XL
1	2	3	4	5	6	7



DBA-4910

ANTİ EMBOLİ VARİS ÇORABI 18-20 mmHg (BELDEN KEMERLİ)

Cerrahi müdahale sonrası yatan hastalarda, yatağa bağımlı hastalarda pıhtı oluşumunu engellemek için kullanılması tavsiye edilir.

ANTI EMBOLIA VACULAR STOCKINGS 18-20 mmHg (WITH WAIST BELT)

It is recommended to be used in hospitalized patients after surgical intervention and in bedridden patients to prevent clot formation.

DBA-4910	DBA-4911	DBA-4912	DBA-4913	DBA-4914
S	M	L	XL	XXL
1	2	3	4	5



DBA-4900

ANTİ EMBOLİ DİZÜSTÜ VARİS ÇORABI 18-20 mmHg

Cerrahi müdahale sonrası yatan hastalarda, yatağa bağımlı hastalarda pıhtı oluşumunu engellemek için kullanılması tavsiye edilir.

ANTI EMBOLY LAPTOP COMPRESSION SOCKS 18-20 mmHg

It is recommended to be used in hospitalized patients after surgical intervention and in bedridden patients to prevent clot formation.

DBA-4900	DBA-4901	DBA-4902	DBA-4903	DBA-4904
S	M	L	XL	XXL
1	2	3	4	5

